


5 Momentov v Hygiene Rúk

zameraných na pacienta so zavedeným periférnym venóznym katétrom



Bezprostredne pred akoukoľvek manipuláciou s katétrom a infúznym systémom vykonajte dezinfekciu rúk alkoholovými dezinfekčnými prostriedkami. Napríklad:

2a. Pred zavádzaním a pri odstraňovaní katétra (použiť jednorazové ochranné rukavice), pred výmenou krytia, pred odberom krvi, pred akoukoľvek manipuláciou s katétrom
2b. Pred manipuláciou s infúznym setom
2c. Pred prípravou infúzných liečiv aplikovaných cez katéter

Bezprostredne po akejkolvek expozícii telesným tekutinám vykonajte dezinfekciu rúk alkoholovými dezinfekčnými prostriedkami. Napríklad:

3a. Po zavádzaní a odstraňovaní katétra
3b. Po odbere krvi z katétra

Kľúčové aspekty starostlivosti o pacienta so zavedeným periférnym venóznym katétrom

1. Indikácia: uistite sa, že je periférny katéter indikovaný. Odstráňte katéter v prípade, že už nie je potrebný, odstránenie je klinicky indikované.
2. Zavádzanie/ošetrovanie/odstránenie
2.1 Pred zavedením katétra vydezinfikujte kožu vhodným antiseptikom (dodržiňte expozičný čas a nechajte voľne zaschnúť bez palpácie dezinfikovaného miesta vpichu - 70 % alkoholovým prostriedkom, jódomou tinktúrou, jódoforom, 2 % chlórhexidínom)
2.2 Počas zavádzania, pri odbere krvi a odstraňovaní katétra použite jednorazové ochranné rukavice a postupujte asepticky („non-touch technika“).

2.3 Výmena gázového krytia každé 2 dni.
2.4 Zvážte výmenu katétra každých 96 hodín.
2.5 Výmena infúznej súpravy každých 96 hodín, s výnimkou podávania krvi, krvných derivátov, chemoterapie a tukových emulzií, kedy je indikovaná výmena každých 24 hodín.
3. Monitoring: vedzte záznamy o dátume a čase zavedenia katétra, odstránenia katétra, výmeny krytia katétra. Katéter každodenne vizuálne kontrolujte.



World Health
Organization

SAVE LIVES
Clean Your Hands

Clean Care
is Safer Care
2005-2015