

IDENTIFIKÁCIA MOŽNÝCH PRÍPADOV COVID-19 po telefóne alebo osobne

Lekár zváži vyvesenie informácií pre pacientov vo forme plagátov pri vchode do ambulantného zdravotníckeho zariadenia. Úlohou plagátu je oboznámiť pacienta s povinnosťou **kontaktovať zdravotníckeho pracovníka ešte pred vstupom do čakárne resp. priestorov zdravotníckeho zariadenia (uviesť telefónne číslo, na ktoré môže volať pacient prichádzajúci na akútne/urgentné ošetrenie), ak má pozitívnu anamnézu cestovania a respiračných príznakov.** Medzi pacientmi v čakárni je riziko prítomnosti pacientov s vírusom COVID-19!

Je nutné ihneď použiť „**triediace otázky**“ na identifikáciu možných prípadov COVID-19.

- A. Pacient žiada **telefonicky** o vyšetrenie alebo konzultáciu – lekár mu položí triediace otázky:
- Pacient bol v zahraničí 14 dní pred nástupom príznakov?
 - Mal kontakt s potvrdeným prípadom COVID-19 v priebehu 14 dní pred nástupom príznakov?
 - Má horúčku nad 38°C?
 - Má príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest (kašeľ) s horúčkou alebo bez nej?
- PACIENT odpovedá negatívne – lekár mu odporučí dodržiavať odporúčané hygienické a preventívne opatrenia.
 - PACIENT odpovedá pozitívne – lekár postupuje nasledovne:
 - Ak má pacient pozitívnu cestovateľskú anamnézu, ale je bez príznakov, lekár nariadi domácu izoláciu (karanténu) pacientovi po dobu 14 dní
 - Pri jednom z príznakov bez cestovateľskej anamnézy alebo bez styku s COVID-19 pacientom, lekár určí liečbu.
 - Ak má pacient jeden z príznakov a pozitívnej cestovateľskej anamnézy, lekár kontaktuje KOS, ktoré určí ďalší postup (odber vzorky)
 - Ak má pacient jeden z príznakov a bol v styku s COVID-19 pacientom, lekár kontaktuje KOS, ktoré určí ďalší postup (odber vzorky...).
 - Pri podozrení na COVID-19 lekár zariadi prevoz na jedno z 10 infekčných oddelení alebo sa urobí odber vzorky na mieste.



Zdroj: ÚV ZSR

KOS – Krízové operačné stredisko (155)

Zzs – Záchraná zdravotná služba (sanitka)

- Ak sa COVID-19 potvrdí, lekár dostane informáciu a hlási ju regionálnemu hygienikovi. Ak má pacient mierny priebeh ochorenia, ostáva v domácej liečbe (jeho spolubývajúci v karanténe).
- Ak sa ochorenie potvrdí a u pacienta je silnejší priebeh, ostáva hospitalizovaný.

B. Pacient **prichádza do ambulancie**

- a. Bol v zahraničí 14 dní pred nástupom príznakov ?
 - b. mal kontakt s potvrdeným prípadom COVID-19 v priebehu 14 dní pred nástupom príznakov
 - c. má horúčku nad 38°C
 - d. má príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest (kašeľ) s horúčkou alebo bez nej
- PACIENT odpovedá negatívne – lekár mu odporučí dodržiavať odporúčané hygienické a preventívne opatrenia.
 - PACIENT odpovedá pozitívne – lekár postupuje nasledovne:
 1. Lekár zabezpečí dočasnú izoláciu pacienta
 2. Pri jeho vyšetrowaní používa ochranné pracovné prostriedky
 - a. respirátor (minimálne rúško)
 - b. rukavice
 - c. okuliare
 - d. plášť.
 3. Požiada pacienta, aby si nasadil rúško (aj improvizované, šál, šatka...) na tvár.
 4. Ak pacient nemôže byť izolovaný, požiadať ho, aby počkal v priestore, ktorý je na to vyhradený. Pokiaľ nie je možné pacienta izolovať vo vyhradenom priestore, tak v čakárni pacienta oddelíte od ostatných vo vzdialenosti minimálne 2 m.
 5. Pacienti s rizikom COVID-19 môžu byť v nevyhnutných prípadoch zoskupení spolu, ale oddelene od ostatných pacientov. Zaisťujete papierové obrúsky, odpadkové koše a dostupnosť k alkoholovej dezinfekcii rúk.
 6. Lekár kontaktuje regionálneho hygienika a kontaktuje KOS.
 7. Po príchode sanitky a odvoze pacienta zabezpečí dekontamináciu priestorov.
 8. Poskytuje epidemiológovi súčinnosť pri epidemiologickom vyšetrowaní a zisťovaní úzkych kontaktov (spolupacienti v čakárni, sprievodné osoby, spolubývajúci, členovia rodiny...)

Minimalizovanie prenosu

Požiadajte pacienta, aby:

- si umyl ruky,
- si nasadil svoje rúško (ak nemá, dajte mu nové) na tvár a poučte ho, čo je správne robiť v prípade kašľa,
- uistite sa, že je zabezpečené dostatočné zásobovanie rúškami, papierovými obrúskami, odpadkovými košmi a dezinfekciou na báze alkoholu,
- zabezpečte, aby sa upratovanie s dezinfekciou vykonalo vždy po vyšetrení suspektného pacienta.

Čistenie v čakárni a ambulancii

Dodržiujte bežné čistiace alebo dezinfekčné postupy, ale vo vyššej frekvencii. Očistite všetky povrchy, s ktorými prišiel pacient do kontaktu s použitím kombinovaného produktu detergentu/dezinficientu.